



Az egészség védelmében

Az egészség védelmében

Megosztás

- [Facebook \(opens in new window\)](#)
- [Twitter \(opens in new window\)](#)
- [Pinterest \(opens in new window\)](#)
- [Download \(opens in new window\)](#)
- [`<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>` E-mail \(opens in new window\)](#)

A cicákat legalább évente egyszer el kell vinni rendszeres állatorvosi ellenőrzésre. Ilyenkor kell beadni nekik az aktuális védőoltásokat is. A macskák az évi immunizálás nélkül esendők és érzékenyek a fertőző betegségekre.

Az újszülött kiscica még védett a külvilág kórokozóival szemben, hiszen a rendszeresen oltott anyjától a placentán keresztül és később az anyatejjel olyan ellenanyagok jutnak a szervezetébe, amelyek immunissá teszik. Ám, ez a védettség fokozatosan csökken, és a kicsmacskákat hét-nyolc hetes koruk körül már be kell oltani, hogy ne kapják el a különböző fertőzések okozta betegségeket. Az oltások akkor hatékonyak, ha évente megismétlik őket.

Hazánkban a macskák oltása nem kötelező. De minden felelős állatartó tisztában van azzal, hogy súlyos betegségektől – és az ezzel járó anyagi és lelki problémáktól – menti meg önmagát és doromboló kedvencét, ha rendszeresen oltatja macskáját.

Akadnak olyan fertőzések, amelyeket a cicák akkor is megkaphatnak, ha lakásban élnek és csak áttételesen, a gazdin és a lakás látogatóin keresztül érintkeznek a külvilággal. Más betegségekkel szemben viszont ezek az állatok védettek, szemben a kijáró cicákkal.

A kerti macskák más állatokkal találkozva, azokkal összeverekedve, illetve idegen állatok váladékával kapcsolatba kerülve könnyen elkaphatnak akár halálos betegségeket. Ezért néhány oltásfajta minden kijáró macskának erősen ajánlott, más immunizáló szérum beadását az állatorvos a körülményeket mérlegelve javasolhatja a gazdának.

A macskanátha (Calicivirus), és a fertőző gyomor- és bélgyulladás (Parvovirus) oltó széruma minden cicának beadandó, a legtöbb állatorvos javasolja még, hogy adassuk be ifjú kedvencünknek a fertőző orr- és légcsőgyulladás (Herpesvirus) elleni oltást is. Ezeket kombináltan, egyetlen szúrással be lehet adni a cicának.

Kedvencünk legtöbbször némi nyávogás után túl teszi magát az inzultuson, néha a szúrás

helyén apró daganat jelentkezhet, amely magától felszívódik. Lehet, hogy az oltás után egy napig elesett, aluszékony a kismacska.

Azonban a teljes védettség kialakulásához két hét múlva meg kell ismételni a kombinált oltást. Az állatorvosok nagyjából 6-8. hetes kor között javasolják az első immunizálást, míg a második oltásra a cica 9-11. hetes korában kell sor kerüljön. A lakásban élő cicusoknak ez a védelem elég is.

Azok a cicák, amelyek kijárnak a lakásból, többféle veszélynek vannak kitéve. Nekik melegen ajánlott még a veszettség vakcina, és a leukózis vakcina, amelyeket a kombinált oltások után 3-4 hetes időközönként lehet beadatni. De leselkedik a kijáró macskákra más veszély is. Ilyen a fertőző hashártyagyulladás (FIP, Coronavirus), valamint a bőrgombászás (dermatophytosis, dermatomycosis) és a fertőző kötőhártyagyulladás (Chlamydophila felis). Ezek ellen a kórokozók ellen is létezik védőoltás, az állatorvos a macska tartási helye, életkora, egészségi állapota, a fertőződés lehetősége alapján minden esetben egyedileg kell mérlegelje, javasolja-e ezen betegségek ellen a védőoltást. A fertőző hashártyagyulladás elleni oltást nem injekcióban, hanem orrcsepp formájában kapja a cica.

A szervezet saját védelmi rendszerét a vakcinában található, gyengített fertőzőképességű, vagy elölt mikroorganizmus aktiválja, és ez csakis teljesen egészséges macskánál működik. Éppen ezért az oltás előtt egy héttel féregteleníteni kell a kiscicát. Ha a macskában paraziták élnek, akkor szervezete általános gyengesége miatt az alapoltásokra sem tud megfelelő immunválasz kialakulni. Viszont azt is tudnunk kell, hogy a szervezet védekezőrendszerének a megfelelő válaszhoz időre – körülbelül 14 napra – van szüksége, ezért nem érdemes túl gyakran oltani állatunkat.

A macskáknak az állatorvos kiállít oltási könyvet is, aminek fontos szerepe lehet, ha kiállításra visszük kedvencünket vagy ha utazni vágyunk vele. Ebben szerepel ugyanis az állatorvos kamara által hitelesített pecsétjével igazolva, hogy mikor, mi ellen oltattuk be cicánkat.

Ajánlott oltási program macskáknak
(dr. Keleti Zoltán és a Budapesti Állatorvos.hu alapján)

Minden macska részére:

6-8 hetes korban: macska kombinált oltás (fertőző gyomor- és bélgyulladás, fertőző- orr és légcsőgyulladás, macskanátha)

8-10 hetes korban (az előző oltást követően 2 héttel): macska kombinált oltás ismétlése.

Kijáró macskák részére:

6-8 hetes korban: macska kombinált oltás (fertőző gyomor- és bélgyulladás, fertőző- orr és légcsőgyulladás, macskanátha)

8-10 hetes korban (az előző oltást követően 2 héttel): macska kombinált oltás ismétlésével egy időben az első veszettség oltás

10-12 hetes korban (az előző oltást követően 2 héttel): macska leukémia (leucosis) elleni első oltás,

12-14 hetes korban (az előző oltást követően 2 héttel): macska leukémia (leucosis) elleni oltás ismétlése.

Szükség esetén:

16 hetes kortól igény és szükségesség szerint fertőző hashártyagyulladás, és bőrgombáság elleni védőoltások

Mennyibe kerül átlagosan az oltás?

Trivalens: 2500-3000 Ft

Kombinált védőoltás: 2500-3500 Ft

Leukózis elleni oltás: 3500-4000 Ft

Veszettség elleni oltás: 2000 - 3500 Ft

Veszettség + kombinált oltás: 4000-6000 Ft

FIP oltás (fertőző hashártyagyulladás): 5000-7000 Ft

Biocan M oltás(bőrgomba elleni): 4500-5000 Ft

[Vissza a felnőtt cikkekhez](#)

Source URL: <https://www.whiskas.hu/felnott/egeszseg/az-egeszseg-vedelmeben>